



Ab 04.10.2022 bieten wir Ihnen die Auffrischimpfung mit auf Omicron angepasstem Impfstoff an

Sprechen Sie uns gerne an!

Wer sollte wann mit welchem Impfstoff geimpft werden?

Im Einzelnen empfiehlt die STIKO:

grundsätzlich ändert sich bezüglich der Indikation der dritten und vierten Impfung nichts

Erste Auffrischimpfung (3. Impfung)

- **Alle Personen ab 12 Jahren grundsätzlich**, vorzugsweise mit einem angepassten mRNA-Impfstoff („neuer“ Impfstoff)
- in der Regel sechs Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder durchgemachter Infektion
- **Ab 12 Jahren können die beiden neuen Impfstoffe von Biontech/Pfizer** verimpft werden („Comirnaty Original/Omicron BA.1“ oder „Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5“)
- **Ab 30 Jahren kann auch die angepasste Vakzine von Moderna** verimpft werden („Spikevax bivalent Original /Omicron BA.1“).

Zweite Auffrischimpfung (4. Impfung) mit einen „neuen“ Impfstoff

- sechs Monate nach dem dritten immunologischen Ereignis (Impfung oder Infektion)
 - Personen über 60 Jahren
 - Personen ab 12 Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19 infolge einer Grunderkrankung, insbesondere Immunschwäche
 - medizinisches Fachpersonal
 - Pflegeheimbewohner
 - Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19 in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Dritte Auffrischimpfung (5. Impfung)

- kann nach ärztlichem Ermessen bei besonders gefährdeten Personen sinnvoll sein.

Mindestabstand von sechs Monaten (zu Impfung oder Infektion)

Quelle: Mitteilung der STIKO vom 20.09.2022:

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-09-20.html